

SCHEMAT PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII

Schemat przygotowania preparatem **FLEET Phospho-soda**:

- Na trzy dni przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać owoców pestkowych(np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek) oraz pestek siemienia lnianego i maku.
- W dniu poprzedzającym badanie można zjeść tylko płynne śniadanie, bez mleka, surowych owoców i warzyw oraz napojów gazowanych. Inne napoje można pić w dowolnej ilości.

Badanie w godzinach porannych:

- W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 14.00 wypić pierwszą butelkę **FLEET Phospho-soda** rozpuszczoną w 1/2 szklance wody **NIEGAZOWANEJ lub przegotowanej** popijając 2 litrami wody **NIEGAZOWANEJ lub przegotowanej** (1 szklankę co 15-20min.) Następnie wypić drugą butelkę preparatu również popijając 2 litrami wody **NIEGAZOWANEJ lub przegotowanej**
- Należy wykonać 2 lewatywy. Pierwszą lewatywę około godziny 22.00 w dniu poprzedzającym badanie. Drugą lewatywę 3 godziny przed badaniem.

Badanie w godzinach popołudniowych:

- Przygotowanie do badania:
około godziny 14.00 wypić pierwszą butelkę **FLEET Phospho-soda** rozpuszczoną w 1/2 szklance wody **NIEGAZOWANEJ lub przegotowanej** popijając 2 litrami wody **NIEGAZOWANEJ lub przegotowanej** (1 szklankę co 15-20min.).
Drugą butelką wypić rano między godziną 7 a 8 popijając 2 litrami wody **NIEGAZOWANEJ lub przegotowanej**
- Od chwili wypicia **FLEET Phospho-soda** nie należy nic jeść. Można pić dowolną ilość **NIEGAZOWANEJ** wody mineralnej, ale należy zaprzestać przyjmowania płynów na 2-3 godziny przed badaniem
- Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynna. Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.
- Należy wykonać 2 lewatywy. Pierwszą lewatywę około godziny 22.00 w dniu poprzedzającym badanie. Drugą lewatywę 3 godziny przed badaniem.

W razie znieczulenia proszę zgłosić się na badanie z osobą towarzyszącą.

UWAGI

- 1.Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienia tętniczego, choroby serca, padaczki i inne) w dniu badania powinny zażyć poranna dawkę popijając niewielką ilością wody.
- 2.Osoby chorujące na cukrzyce powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszego ośrodka.
- 3.Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, sintrom, ticlid lub aspiryna, acard, acesen i inne) powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem; należy to jednak wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym. Konieczna może być zamiana tych leków na heparynę niskocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexane).
- 4.Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej
- 5.Po badaniu wykonanym w znieczuleniu pacjent pozostaje w Poradni przez około 1,5-2 godziny; po tym czasie pod opieką osoby towarzyszącej może udać się do domu. Obowiązuje 12- godzinny bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i maszyn mechanicznych oraz picia alkoholu.
- 6.Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.