

SCHEMAT PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII

Schemat przygotowania preparatem **FORTTRANS**:

- Na trzy dni przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać owoców pestkowych(np. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek) oraz pestek siemienia lnianego i maku.
- W dniu poprzedzającym badanie można zjeść tylko płynne śniadanie, bez mleka, surowych owoców i warzyw oraz napojów gazowanych. Inne napoje można pić w dowolnej ilości.

Badanie w godzinach porannych:

- W dniu poprzedzającym badanie, około godziny 14.00, zgodnie z instrukcją, należy przygotować 4 litry roztworu Fortransu rozpuszczając każdą z 4 torebek w 1 litrze **NIEGAZOWANEJ** wody. Przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 4-6 godzin. 1 szklanka co 15-20min.
- Należy wykonać 2 lewatywy. Pierwszą lewatywę około godziny 22.00 w dniu poprzedzającym badanie. Drugą lewatywę 3 godziny przed badaniem.

Badanie w godzinach popołudniowych:

- Przygotowanie do badania:
Przygotować 2 saszetki zgodnie z instrukcją tj. 1 saszetka / 1 litr przegotowanej, zimnej wody lub niegazowanej wody mineralnej. Dla poprawy smaku można dodać wyciśnięty sok z cytryny.
Wymieszaj do całkowitego rozpuszczenia się proszku.
Około godziny 16-17, w dniu poprzedzającym badanie wypij dwa litry tak otrzymanego roztworu w tempie ok. 1 litra na godzinę. W dniu badania, rano, przygotuj kolejne dwa litry roztworu i wypij także w tempie ok. 1 litra na godzinę. Zaleca się, aby ostatnią szklankę leku wypić na 3-5 godziny przed badaniem.
- Od chwili wypicia Fortranu nie należy nic jeść. Można pić dowolną ilość **NIEGAZOWANEJ** wody mineralnej, ale należy zaprzestać przyjmowania płynów na 2-3 godziny przed badaniem
- Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynna. Wypróżnienia prawie czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie do badania.
- Przed zastosowaniem preparatu **FORTTRANS** prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej dołączonej do preparatu.
- W dniu badania nie należy przyjmować jakichkolwiek posiłków, natomiast wodę można pić do 3 godzin przed badaniem.
- Należy wykonać 2 lewatywy. Pierwszą lewatywę około godziny 22.00 w dniu poprzedzającym badanie. Drugą lewatywę 3 godziny przed badaniem.

W razie znieczulenia proszę zgłosić się na badanie z osobą towarzyszącą.

UWAGI

1. Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków (np. nadciśnienia tętniczego, choroby serca, padaczki i inne) w dniu badania powinny zażyć poranna dawkę popijając niewielką ilością wody.
2. Osoby chorujące na cukrzyce powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy rejestrację naszego ośrodka.
3. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi (np. acenocumarol, sintrom, ticlid lub aspiryna, acard, acesen i inne) powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem; należy to jednak wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym. Konieczna może być zamiana tych leków na heparynę niskocząsteczkową (np. Fraxiparyna, Clexane).
4. Prosimy o przyniesienie i pokazanie lekarzowi przed badaniem posiadanej dokumentacji medycznej
5. Po badaniu wykonanym w znieczuleniu pacjent pozostaje w Poradni przez około 1,5-2 godziny; po tym czasie pod opieką osoby towarzyszącej może udać się do domu. Obowiązuje 12- godzinny bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i maszyn mechanicznych oraz picia alkoholu.
6. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.